MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD

1. El conjunto de los números enteros.

Existen magnitudes que tienen dos sentidos, por lo cual no basta con número y unidad para representarlas. Por ejemplo, contextos en los que aparecen magnitudes **con dos sentidos** son:

- Un lugar geográfico puede encontrarse por encima o por debajo del nivel del mar.
- El saldo de una cuenta bancaria puede tener superávit o déficit.
- La temperatura en una zona puede estar por encima o por debajo de cero grados.
- El año en que ocurrió un hecho histórico pudo ser antes o después de Cristo.

Para representar los valores que toman este tipo de magnitudes, se usan números a los que se les antepone un signo + ó –, dependiendo del sentido de la magnitud. Si tienen signo + se les llama números **enteros positivos** y si tienen signo – se les llama **enteros negativos**.

El conjunto de los números **enteros** es $\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$

Obsérvese que el conjunto de los números **naturales**, $\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$, está incluido en el conjunto de los números enteros: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Nota: salvo que estén formando parte de operaciones combinadas, no es necesario escribir el signo + delante de los números positivos. Es decir, $+3 = 3$; $+11 = 11$; $+19 = 19 \dots$

Signo de una fracción

a) Si el numerador y el denominador tienen distinto signo, entonces la **fracción** es **negativa**.

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \qquad \text{Ejemplos: } \frac{-4}{7} = -\frac{4}{7} \qquad \frac{4}{-7} = -\frac{4}{7}$$

b) Si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, entonces la **fracción** es **positiva**.

$$\frac{-a}{-b} = \frac{+a}{+b} = +\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \qquad \text{Ejemplos: } \frac{-4}{-7} = \frac{4}{7} \qquad \frac{+4}{+7} = \frac{4}{7}$$

Representación y orden en $\mathbb{Z}$

Para representar números enteros, se traza una línea recta y se marca en el centro de la recta el número 0. A continuación, se marca el número 1 a la derecha del cero, quedando así establecida la distancia equivalente a una unidad. Los enteros **positivos** se marcan a la **derecha** del cero y los **negativos** a la **izquierda** del cero, repitiendo la unidad anterior tantas veces como sea necesario.

Orden en $\mathbb{Z}$: las relaciones de orden entre $a, b \in \mathbb{Z}$, se expresan de las siguientes formas:

- (1) $a < b$ se lee "**a** es menor que **b**" (2) $a \leq b$ se lee "**a** es menor o igual que **b**"
(3) $a > b$ se lee "**a** es mayor que **b**" (4) $a \geq b$ se lee "**a** es mayor o igual que **b**"

Obsérvese que entre dos números negativos, el menor de los dos es el que se encuentra más lejos del cero.

Ejemplos: $-5 < -3$ $-3 < 2$ $-4 > -8$ $3 > -6$ $-5 < 0$ $5 > 0$

Opuesto y valor absoluto de un número entero

Dado un número entero n , se dice que el **opuesto de n** es $-n$. Por lo tanto, dos números son **opuestos** si se diferencian solo en el signo.

Por ejemplo, los números 3 y -3 son opuestos; los números 5 y -5 son opuestos; los números 7 y -7 son opuestos, ...

Dado un número entero n , se dice que el **valor absoluto de n** es la distancia entre n y el 0 . Por lo tanto, el valor absoluto de un número es el valor que resulta al prescindir de su signo. Se representa por $|n|$.

Ejemplos: $|+3|=3$ $|-3|=3$ $|+5|=5$ $|-5|=5$

Obsérvese que dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto ya que ambos están situados a la misma distancia del cero.

2. Operaciones con números enteros.

A) Suma y resta de números enteros

Paso 1. Se resuelven los paréntesis teniendo en cuenta que el signo negativo delante de un paréntesis cambia de signo a todos los números que están dentro del paréntesis.

Paso 2. Se agrupan y se suman los números positivos por un lado.

Paso 3. Se agrupan y se suman los números negativos por otro lado, escribiendo con signo negativo el resultado final.

Paso 4. Se restan los resultados anteriores y se pone delante el signo del mayor de ellos.

Ejemplo 1: $10 - (-2) + (-5) - (+12) - (-4) + 3 - (+7) = 10 + 2 - 5 - 12 + 4 + 3 - 7 =$
 $= 10 + 2 + 4 + 3 - 5 - 12 - 7 = +19 - 24 = -5$

Ejemplo 2: $1 - (+6) - (-4) - (-2) - (+3) + (-2) + 1 = 1 - 6 + 4 + 2 - 3 - 2 + 1 =$
 $= 1 + 4 + 2 + 1 - 6 - 3 - 2 = +8 - 11 = -3$

B) Multiplicación y división de números enteros

Paso 1. Se multiplican o se dividen de forma natural.

Paso 2. Delante del resultado se pone:

el signo $+$ si ambos son del mismo signo o,

el signo $-$ si ambos son de signo contrario.

$+$	$\cdot$	$+$	$=$	$+$
$-$	$\cdot$	$-$	$=$	$+$
$+$	$\cdot$	$-$	$=$	$-$
$-$	$\cdot$	$+$	$=$	$-$
$+$	$:$	$+$	$=$	$+$
$-$	$:$	$-$	$=$	$+$
$+$	$:$	$-$	$=$	$-$
$-$	$:$	$+$	$=$	$-$

Ejemplos: $(-6) \cdot 6 = -36$ $(-6) \cdot (-4) = +24$
 $(-8) : (-4) = +2$ $(-8) : 2 = -4$

Nota: si a los signos de la suma, resta, producto o cociente le sigue un número negativo, éste se debe escribir entre paréntesis.

Mal escrito: $7 + -3$ Bien escrito: $7 + (-3)$ Mal escrito: $7 - -3$ Bien escrito: $7 - (-3)$

Mal escrito: $7 \cdot -3$ Bien escrito: $7 \cdot (-3)$ Mal escrito: $7 : -3$ Bien escrito: $7 : (-3)$

3. Potencias de exponente entero.

A) Potencia de base entera y exponente natural

Dados los números $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, se llama **potencia de base a y exponente n** al producto del número a por sí mismo n veces. Se representa por a^n .

Ejemplos: $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$ $(-1)^4 = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = 1$

Signo de una potencia de base entera y exponente natural

1. Si la **base** tiene signo **positivo**, el resultado siempre tiene signo **positivo**. Da lo mismo que el exponente sea par o impar.

Ejemplos: $(+2)^3 = (+2) \cdot (+2) \cdot (+2) = +8$ $(+3)^4 = (+3) \cdot (+3) \cdot (+3) \cdot (+3) = +81$

2. Si la **base** tiene signo **negativo** y el **exponente** es **par**, el resultado tiene signo **positivo**.

Ejemplos: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$ $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +16$

3. Si la **base** tiene signo **negativo** y el **exponente** es **impar**, el resultado tiene signo **negativo**.

Ejemplos: $(-3)^3 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27$ $(-2)^5 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$

Propiedades de las potencias

P1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Ejemplo: $(-3)^2 \cdot (-3)^4 = (-3)^6$ porque $(-3)^2 \cdot (-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = (-3)^6$

P2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

Ejemplo: $\frac{(-3)^5}{(-3)^3} = (-3)^2$ porque $\frac{(-3)^5}{(-3)^3} = \frac{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)}{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3)} = (-3) \cdot (-3) = (-3)^2$

P3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Ejemplo: $((-5)^2)^3 = (-5)^6$ porque $((-5)^2)^3 = (-5)^2 \cdot (-5)^2 \cdot (-5)^2 = (-5)^6$

P4. $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$

Ejemplo: $5^3 \cdot 2^3 = (5 \cdot 2)^3 = 10^3 = 1000$

P5. $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$

Ejemplo: $\frac{10^3}{5^3} = \left(\frac{10}{5}\right)^3 = 2^3 = 8$

P6. $a^0 = 1$ porque $a^0 = a^{n-n} = \frac{a^n}{a^n} = 1$

Ejemplos: $7^0 = 1$ $(-3)^0 = 1$

B) Potencia de base fraccionaria y exponente natural

Dados $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ $b \neq 0$ $n \in \mathbb{N}$, la **potencia de base** $\frac{a}{b}$ y **exponente n** se escribe $\left(\frac{a}{b}\right)^n$

y equivale a multiplicar la base $\frac{a}{b}$ por sí misma **n** veces.

Ejemplo 1: $\left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{243}{32}$ $\left(\frac{3}{2}\right)^5$ tiene base $\frac{3}{2}$ y exponente 5

Ejemplo 2: $\left(-\frac{2}{5}\right)^3 = \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{8}{125}$ $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$ tiene base $-\frac{2}{5}$ y exponente 3

Propiedades de las potencias

Las potencias de base fraccionaria cumplen las mismas propiedades que las potencias de base un número entero.

P1. $\left(\frac{a}{b}\right)^m \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m+n}$ P2. $\left(\frac{a}{b}\right)^m : \left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m-n}$ P3. $\left[\left(\frac{a}{b}\right)^m\right]^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m \cdot n}$

P4. $\left(\frac{a}{b}\right)^m \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^m = \left(\frac{a \cdot c}{b \cdot d}\right)^m$ P5. $\left(\frac{a}{b}\right)^m : \left(\frac{c}{d}\right)^m = \left(\frac{a : c}{b : d}\right)^m$ P6. $\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$

Ejemplo 1: $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{243}{32}$ Ejemplo 2: $\left(\frac{3}{4}\right)^6 : \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$

Ejemplo 3: $\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729}$ Ejemplo 4: $\left(\frac{3}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^3 = \left(\frac{3 \cdot 10}{5 \cdot 3}\right)^3 = \left(\frac{30}{15}\right)^3 = 2^3 = 8$

Ejemplo 5: $\left(\frac{2}{9}\right)^2 : \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{9} : \frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{6}{9}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ Ejemplo 6: $\left(\frac{7}{9}\right)^0 = 1$ $\left(-\frac{7}{9}\right)^0 = 1$

C) Potencia de base entera y exponente entero negativo

Dados $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, la **potencia de base a** y **exponente negativo -n** equivale a una fracción de numerador 1 y denominador a^n .

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Demostración: $a^{-n} = a^{0-n} = \frac{a^0}{a^n} = \frac{1}{a^n}$

Ejemplos: $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$ $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ $(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$

Ejemplos: $\frac{5^3}{5^7} = 5^{-4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{625}$ $(2^{-2})^3 = \left(\frac{1}{2^2}\right)^3 = \frac{1^3}{(2^2)^3} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64}$

$$5^4 \cdot 5^{-6} = 5^4 \cdot \frac{1}{5^6} = \frac{5^4}{5^6} = 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Ejemplos: $(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-8} = -\frac{1}{8}$ $-5^{-2} = -\frac{1}{5^2} = -\frac{1}{25}$ $-2^{-3} = -\frac{1}{2^3} = -\frac{1}{8}$

D) Potencia de base fraccionaria y exponente entero negativo

Dados $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ $b \neq 0$ $n \in \mathbb{N}$, la **potencia de base $\frac{a}{b}$** y **exponente negativo $-n$**

equivale a una potencia de base $\frac{b}{a}$ y exponente **n**.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Demostración: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \frac{1}{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{1}{1} \cdot \frac{b^n}{a^n} = \frac{b^n}{a^n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

Ejemplos: $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{1}\right)^3 = \frac{2^3}{1^3} = 8$ $\left(\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} = \left(\frac{3}{1}\right)^6 = \frac{3^6}{1^6} = 729$

4. Raíces cuadradas y raíces cúbicas.

A) Raíz cuadrada de un número racional

Dado x entero o fraccionario de signo positivo, se llama **raíz cuadrada de x** a un número cuyo cuadrado es igual a x . La raíz cuadrada de x se representa por $\sqrt{x}$.

$$\sqrt{x} = r \Leftrightarrow r^2 = x$$

Ejemplos: $\sqrt{25} = 5$ $\sqrt{81} = 9$ $\sqrt{121} = 11$ $\sqrt{361} = 19$ $\sqrt{576} = 24$

$$\sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{5}{6} \quad \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \quad \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \quad \sqrt{\frac{64}{9}} = \frac{8}{3} \quad \sqrt{\frac{81}{49}} = \frac{9}{7}$$

De la definición se deduce lo siguiente:

- **Un número positivo tiene dos raíces cuadradas opuestas.**

Ejemplo: $r^2 = 9 \Rightarrow r = \pm 3$ porque $3^2 = 9$ y $(-3)^2 = 9$

- **Un número negativo no tiene raíz cuadrada.**

Ejemplo: $\sqrt{-9}$ no existe ($\nexists \sqrt{-9}$) porque no hay ningún número cuyo cuadrado sea -9 .

Interpretación geométrica: $\sqrt{x}$ es el lado de un cuadrado de área x .

Ejemplo: si un pintor quiere hacer un mural cuadrado de 36 m^2 , el ancho y largo del mural deben medir $\sqrt{36} = 6 \text{ m}$, respectivamente. No se puede decir que un lado "mida -6 m ".

B) Raíz cúbica de un número racional

Dado $x \in \mathbb{Q}$, se llama **raíz cúbica de x** al número cuyo cubo es igual a x . La raíz cúbica de x se representa por $\sqrt[3]{x}$.

$$\sqrt[3]{x} = r \Leftrightarrow r^3 = x$$

Todos los números tienen una raíz cúbica. Un número y su raíz cúbica tienen el mismo signo.

Ejemplo 1: $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$

Ejemplo 2: $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$

Interpretación geométrica: $\sqrt[3]{x}$ es la arista de un cubo de volumen x .

Si se desea fabricar una caja cúbica de 27 m^3 de volumen, el largo, ancho y alto de la caja deben medir $\sqrt[3]{27} = 3 \text{ m}$, respectivamente.

5. Jerarquía de las operaciones.

El orden de ejecución de las operaciones combinadas con paréntesis, potencias o/y raíces, multiplicaciones o/y divisiones, sumas o/y restas, es el siguiente:

Paso 1. Se resuelven las operaciones que hay dentro de los **paréntesis**. Si hay paréntesis encajados, se resuelven de dentro hacia fuera.

Paso 2. Se resuelven las **potencias o/y raíces**.

Paso 3. Se resuelven las **multiplicaciones o/y divisiones**. Si éstas se encuentran seguidas, tiene prioridad la que se encuentre más a la izquierda.

Paso 4. Se resuelven las **sumas o/y restas**. Si éstas se encuentran seguidas, tiene prioridad la que se encuentre más a la izquierda.

Ejemplo 1: $3 \cdot 5^2 - \sqrt{16} \cdot 5^2 = 3 \cdot 25 - 4 \cdot 25 = 75 - 100 = -25$

Ejemplo 2: $\sqrt{4} \cdot (-\sqrt{9}) + 2^2 \cdot (-1 - 2) = 2 \cdot (-3) + 4 \cdot (-3) = -6 - 12 = -18$

Ejemplo 3: $\sqrt{49} - 5 \cdot (-3) + \sqrt{16} \cdot (-5) - 2^3 = 7 + 15 - 20 - 8 = 22 - 28 = -6$

Ejemplo 4: $9 - ((4 \cdot 3^2) - (1 + 4 \cdot 7)) = 9 - ((4 \cdot 9) - (1 + 28)) = 9 - (36 - 29) = 9 - 7 = 2$

Ejemplo 5: $- [(-4 \cdot 2^3) - (1 + 7 \cdot (-6))] = - [(-4 \cdot 8) - (1 - 42)] = - (-32 + 41) = +32 - 41 = -9$