



## GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

Caso sospechoso: cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas posibles: odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico, cefaleas...



## GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO DE UN/A TRABAJADOR/A EN EL CENTRO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

Caso sospechoso: cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas posibles: odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico, cefaleas...



# GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA COMUNICACIÓN DE UN CONTAGIO CONFIRMADO DE UN CONTACTO DIRECTO CONVIVIENTE DE UN ALUMNO/A DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

ALUMNO/A

1. Traslado a la sala de aislamiento. La persona que lo/la acompañe deberá llevar el material de protección adecuado
2. Contactar con la familia para que acudan a recogerlo. La familia ha de contactar con el centro médico.
3. Contactar con el enlace del SSPA para comunicarlo.

Hasta la realización de la PCR:

- El alumno/a debe permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
- La actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.

PCR (+)

El alumno/a debe permanecer en aislamiento el tiempo determinado por el SSPA.

El SSPA contactará con el centro para informar del resultado e indicar el procedimiento a seguir con los contactos estrechos.

PCR (-)

El alumno/a debe permanecer en aislamiento el tiempo determinado por el SSPA.

El SSPA contactará con el centro para informar del resultado.