TERMOQUÍMICA

Energía interna, calor, trabajo, entalpía, ley de Hess, entropía, energía de Gibbs, espontaneidad.

1) Entalpía de reacción. Exotérmica/endotérmica. Factor de conversión.

Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción:

a) Calcule la entalpía de reacción estándar, a 25°C, indicando si es exotérmica o endotérmica.

b) ¿Qué energía se desprende cuando se forman 500 g de glucosa a partir de sus elementos?.

Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})] = -673'3 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{CO}_2(\text{g})] = -393'5 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(\text{l})] = -285'8 \text{ kJ/mol}$. Masas atómicas: C = 12 ; H = 1 ; O = 16

QUÍMICA. 2015. JUNIO. EJERCICIO 6. OPCIÓN B

2) Entalpía de reacción. Exotérmica/endotérmica. Factor de conversión.

Para la obtención del tetracloruro de carbono según:

a) Calcule el calor de reacción, a presión constante, a 25°C y en condiciones estándar.

b) ¿Cuál es la energía intercambiada en la reacción anterior, en las mismas condiciones, cuando se forma un litro de tetracloruro de carbono cuya densidad es 1'4 g/mL.

Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{CS}_2(\text{l})] = 89'70 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{CCl}_4(\text{l})] = -135'40 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ[\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})] = -59'80 \text{ kJ/mol}$. Masas atómicas: C = 12 ; Cl = 35'5

QUÍMICA. 2014. JUNIO. EJERCICIO 5. OPCIÓN A

3) Entalpía de reacción. Exotérmica/endotérmica. Factor de conversión.

La reacción utilizada para la soldadura aluminotérmica es:

a) Calcule el calor a presión constante y el calor a volumen constante intercambiados en condiciones estándar y a la temperatura de la reacción.

b) ¿Cuántos gramos de Al_2O_3 se habrán obtenido cuando se desprendan 10000 kJ en la reacción?.

Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})] = -1675'7 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})] = -824'2 \text{ kJ/mol}$;

Masas atómicas: Al = 27 ; O = 16;

QUÍMICA. 2011. JUNIO. EJERCICIO 5. OPCIÓN B

4) Entalpía de reacción. Exotérmica/endotérmica. Factor de conversión.

Para la fabricación industrial del ácido nítrico, se parte de la oxidación catalítica del amoníaco, según:

a) Calcule la entalpía de esta reacción a 25 °C, en condiciones estándar.

b) ¿Qué volumen de NO, medido en condiciones normales, se obtendrá cuando reaccionan 100 g de amoníaco con exceso de oxígeno?

Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(\text{l})] = -285'8 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{NH}_3(\text{g})] = -46'1 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ[\text{NO}(\text{g})] = 90'25 \text{ kJ/mol}$. Masas atómicas: N = 14 ; H = 1

QUÍMICA. 2010. RESERVA 2. EJERCICIO 6. OPCIÓN A

TERMOQUÍMICA

Energía interna, calor, trabajo, entalpía, ley de Hess, entropía, energía de Gibbs, espontaneidad.

5) Calor de reacción a presión y volumen cte. Qp y Qv

Teniendo en cuenta las entalpías estándar de formación a 25°C del butano, C_4H_{10} , dióxido de carbono y agua líquida son, respectivamente, $-125'7$, $-393'5$ y $-285'5$ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, calcula el calor de combustión estándar del butano a esa temperatura:

a) A presión constante.

b) A volumen constante.

Datos: $R = 8'31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

QUÍMICA. 2015. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 5. OPCIÓN A

6) Calor de reacción a presión y volumen cte. Qp y Qv

Cuando se queman 2,35 g de benceno líquido (C_6H_6) a volumen constante y a 25°C se desprenden 98'53 kJ. Sabiendo que el agua formada se encuentra en estado líquido, calcule:

a) El calor de combustión del benceno a volumen constante y a esa misma temperatura.

b) El calor de combustión del benceno a presión constante y a esa misma temperatura.

Datos: $R = 8'31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Masas atómicas $C = 12$; $H = 1$.

QUÍMICA. 2014. RESERVA 1. EJERCICIO 5. OPCIÓN B

7) Entalpía H + entropía S + energía de Gibbs G

Dada la ecuación termoquímica a 25°C:

Calcule:

a) El calor de la reacción a volumen constante.

b) La energía libre de Gibbs a la temperatura de 25°C.

Datos: $S^0[(NH_3)_g] = 192'3 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$; $S^0[(N_2)_g] = 191 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$;

$S^0[(H_2)_g] = 130'8 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$; $R = 8'31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

QUÍMICA. 2012. JUNIO. EJERCICIO 6. OPCIÓN B

8) Entalpía H + entropía S + energía de Gibbs G

Dada la reacción: $2H_2S(g) + SO_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) + 3S(s)$

a) Calcule la entalpía de esta reacción a 25 °C, en condiciones estándar.

b) En estas condiciones, determine si la reacción es espontánea.

Datos: $\Delta H_f^0[H_2S(g)] = -20'63 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^0[SO_2(g)] = -296'8 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^0[H_2O(l)] = -285'8 \text{ kJ/mol}$; $S^0[H_2S(g)] = 205'8 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;

$S^0[SO_2(g)] = 248'2 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $S^0[H_2O(l)] = 69'9 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;

$S^0[S(s)] = 31'8 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

QUÍMICA. 2011. RESERVA 1. EJERCICIO 6. OPCIÓN A

TERMOQUÍMICA

Energía interna, calor, trabajo, entalpía, ley de Hess, entropía, energía de Gibbs, espontaneidad.

9) Entalpía H + entropía S + energía de Gibbs G. Temperatura para no ser espontánea.

La conversión de metanol en etanol puede realizarse a través de la siguiente reacción (sin ajustar):

a) Calcule la entalpía de reacción estándar.

b) Suponiendo que ΔH y ΔS no varían con la temperatura, calcule la temperatura a la que la reacción deja de ser espontánea.

Datos: $\Delta H_f^\circ[\text{CO(g)}] = -110'5 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{CH}_3\text{OH(g)}] = -201'5 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(g)}] = -235'1 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O(g)}] = -241'8 \text{ kJ/mol}$.

Variación de entropía de la reacción: $\Delta S^\circ = -227'4 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$.

QUÍMICA. 2008. RESERVA 3 EJERCICIO 6. OPCIÓN B

10) Entalpía H + entropía S + energía de Gibbs G. Temperatura para ser espontánea.

Dada la reacción (sin ajustar): $\text{SiO}_2\text{(s)} + \text{C(grafito)} \rightarrow \text{SiC(s)} + \text{CO(g)}$

a) Calcule la entalpía de reacción estándar.

b) Suponiendo que ΔH y ΔS no varían con la temperatura, calcule la temperatura mínima para que la reacción se produzca espontáneamente.

Datos:

$\Delta H_f^\circ[\text{SiC(s)}] = -65'3 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{SiO}_2\text{(s)}] = -910'9 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ[\text{CO(g)}] = -110'5 \text{ kJ/mol}$

. Variación de entropía de la reacción: $\Delta S^\circ = 353 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$

QUÍMICA. 2007. RESERVA 4. EJERCICIO 5. OPCIÓN B

11) Ley de Hess.

a) Calcule el calor de formación del metano a presión constante, en condiciones estándar y a 25°C, a partir de los siguientes datos

b) Calcule el calor producido cuando se queman 10 m³ de metano medidos a 1 atm de presión y a 25°C.

Datos: $R = 0'082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

QUÍMICA. 2016. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 5. OPCIÓN A

12) Ley de Hess.

Determine:

a) La entalpía de la reacción en la que se forma 1 mol de $\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}$ a partir de los elementos que lo integran. Utilice los siguientes datos:

b) La energía necesaria para la formación de 50 L de $\text{N}_2\text{O}_5\text{(g)}$ a 25°C y 1 atm de presión a partir de los elementos que lo integran. Dato: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

QUÍMICA. 2014. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 6. OPCIÓN A

TERMOQUÍMICA

Energía interna, calor, trabajo, entalpía, ley de Hess, entropía, energía de Gibbs, espontaneidad.

13) Energía de enlace. Calor de reacción.

El propano (C_3H_8) es uno de los combustibles fósiles más utilizados.

- Formule y ajuste su reacción de combustión y calcule la entalpía estándar de combustión.
- Calcule los litros de dióxido de carbono que se obtienen, medidos a $25^\circ C$ y 760 mmHg, si la energía intercambiada ha sido de 5990 kJ.

Datos: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Energías medias de enlace ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$): $(C-C) = 347$; $(C-H) = 415$; $(O-H) = 460$; $(O=O) = 494$ y $(C=O) = 730$.

QUÍMICA. 2015. RESERVA 4. EJERCICIO 5. OPCIÓN A

14) Energía de enlace. Calor de reacción.

A partir de los siguientes valores de energías de enlace en kJ/mol: $C=O(707)$; $O=O(498)$; $H-O(464)$; $C-H(414)$, calcule:

- La variación de entalpía para la reacción: $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$.
- ¿Qué energía se desprende al quemar $CH_4(g)$ con 10,5 L de O_2 medidos a 1 atm y $125^\circ C$?

Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

QUÍMICA. 2014. RESERVA 4. EJERCICIO 5. OPCIÓN A

15) Energía de enlace. Calor de reacción.

- Calcule la variación de entalpía de formación del amoníaco, a partir de los siguientes datos de energías de enlace:

$E(H-H) = 436 \text{ kJ/mol}$; $E(N-H) = 389 \text{ kJ/mol}$; $E(N \equiv N) = 945 \text{ kJ/mol}$

- Calcule la variación de energía interna en la formación del amoníaco a la temperatura de $25^\circ C$.

Dato: $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

QUÍMICA. 2012. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 6. OPCIÓN A

16) Energía de enlace. Calor de reacción.

Para la reacción: $CH_4(g) + Cl_2(g) \rightarrow CH_3Cl(l) + HCl(g)$

- Calcule la entalpía de reacción estándar a $25^\circ C$, a partir de las entalpías de enlace y de las entalpías de formación en las mismas condiciones de presión y temperatura.

- Sabiendo que el valor de ΔS° de la reacción es $11,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ y utilizando el valor de ΔH° de la reacción obtenido a partir de los valores de las entalpías de formación, calcule el valor de ΔG° .

Datos: $\Delta H_f^\circ [CH_4(g)] = -74,8 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ [CH_3Cl(l)] = -82,0 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ [HCl(g)] = -92,3 \text{ kJ/mol}$;

Entalpías de enlace en kJ/mol: $(C-H) = 414$; $(Cl-Cl) = 243$; $(C-Cl) = 339$; $(H-Cl) = 432$

QUÍMICA. 2010. JUNIO. EJERCICIO 6. OPCIÓN B

17) Termoquímica. Razonamiento.

Dada la siguiente ecuación termoquímica: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ $\Delta H = -483,6 \text{ kJ}$

Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas:

- Al formarse 18 g de agua en esas condiciones se desprenden 483,6 kJ.
- Dado que $\Delta H < 0$, la formación de agua es un proceso espontáneo.
- La reacción de formación del agua será muy rápida.

Masas atómicas: $H = 1$; $O = 16$.

QUÍMICA. 2016. JUNIO. EJERCICIO 3. OPCIÓN B

TERMOQUÍMICA

Energía interna, calor, trabajo, entalpía, ley de Hess, entropía, energía de Gibbs, espontaneidad.

18) Termoquímica. Razonamiento.

Para la reacción siguiente: $2\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + 7\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta\text{H} < 0$

Razone:

- Si a una misma temperatura, el calor desprendido a volumen constante es mayor, menor o igual que el desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante.
- Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.
- Si la reacción será espontánea a cualquier temperatura.

QUÍMICA. 2013. SEPTIEMBRE. EJERCICIO 3. OPCIÓN B

19) Termoquímica. Razonamiento.

Dadas las siguientes ecuaciones termoquímicas:

Justifique:

- El signo que probablemente tendrá la variación de entropía en cada caso.
- El proceso que será siempre espontáneo.
- El proceso que dependerá de la temperatura para ser espontáneo.

QUÍMICA. 2012. JUNIO. EJERCICIO 4. OPCIÓN A

20) Termoquímica. Razonamiento.

Sin efectuar cálculo alguno justifique, para cada uno de los siguientes procesos, si será siempre espontáneo, si no lo será nunca o si lo será dependiendo de la temperatura:

QUÍMICA. 2014. RESERVA 3. EJERCICIO 3. OPCIÓN B

21) Termoquímica. Razonamiento.

a) Razone si las reacciones con valores positivos de ΔS° siempre son espontáneas a alta temperatura.

b) La siguiente reacción (sin ajustar) es exotérmica:

Justifique si a presión constante se desprende más, igual o menos calor que a volumen constante.

c) Razone si en un proceso exotérmico la entalpía de los reactivos es siempre menor que la de los productos.

QUÍMICA. 2014. RESERVA 2. EJERCICIO 4. OPCIÓN A

22) Termoquímica. Razonamiento.

Dado el siguiente proceso de disolución:

Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- El proceso es exotérmico.
- Se produce un aumento de la entropía.
- El proceso es siempre espontáneo.

QUÍMICA. 2015. RESERVA 1. EJERCICIO 3. OPCIÓN B